



PRODUCT INFORMATION

Fudebio-tech

辣根过氧化物酶标记的山羊抗兔IgG(h+l)

100ul 辣根过氧化物酶标记的山羊抗兔 IgG(h+l)

#FDR007

Lot: _

Store 辣根过氧化物酶标记的山羊抗兔 IgG(h+l)

at -20°C temperature.

Catalog no	FDR007
Size	100ul
辣根过氧化物酶标记的山羊抗兔 IgG(h+l)	100ul

Description

经免疫电泳分析,此抗体可以与兔 IgG 的重链及兔的大多数免疫球蛋白的轻链反应,与非免疫球蛋白的血清蛋白不反应。

有效期:一年

原产地:美国

抗体特异性:经免疫电泳分析,此抗体可以与兔IgG的重链及兔的大多数免疫球蛋白的轻链反应,与非免疫球蛋白的血清蛋白不反应。

产品信息:

性状:液体

规格:进口分装为0.1ml

稳定剂:15ml/ml的牛血清白蛋白

防腐剂:0.01%Thimerosal(水杨乙汞)

缓冲液:0.01M 磷酸钠,0.25M Nacl,PH 7.6

建议使用浓度:

免疫组化:1::500-1:5,000

Elisa或Western Blot:1:5,000-200,000

注意事项:

1. 由于NaNB₃会抑制HRP的活性,因此二抗的保存或回收应避免使用NaNB₃。
2. 用户可根据需要选用我公司提供的以色列BioindECL试剂盒、增强型ECL试剂盒,超敏型ECL试剂盒,PVDF膜,NC膜。HRP标记的二抗:主要有山羊抗鼠(Goat anti-Mouse IgG-HRP)羊抗兔(Goat anti-Rabbit IgG-HRP),兔抗羊(Rabbit anti-Goat IgG-HRP)。膜染色液,膜再生液,膜封闭液,内参抗体: GAPDH,Beta-Actin。预染蛋白Marker。
3. 更多的Western Blot 产品详见我公司编写Western Blot专刊或者来电咨询。